

# Herzlich willkommen im Rettungsdienst Seetal



was sie erwartet

- Geschichte
- Organisation
- Grundsätze der Notfallversorgung
- Strategische Ziele



- Mai 1975, Gründung Verein Ambulanz Seetal
- Dez. 1993, Aufschaltung Sanitätsnotruf 144
- Jan. 2009, Seetal Award – Gwärb Hochdorf
- Nov. 2010, Bezug neues Gebäude
- Juli 2013, Start Organisationsentwicklung
- Sep. 2015, Anerkannter Rettungsdienst IVR
- Dez. 2016, Bewilligung zum Betrieb eines Transport- und Rettungsunternehmens

## Einsatzgebiet / Kernaufgaben

### Daten:


- ca. 30000 Einwohner
- 2019 > 1907 Einsätze

### Kernaufgaben:

- Primäreinsätze (P1A,P1,P2,P3)
- Sekundäreinsätze (S1A,S1,S2,S3)

### Weitere Aufgaben:

- Partnerhilfe
- Event



Unmittelbar von Tod oder gesundheitlicher Schädigung bedrohter, erkrankter oder verletzter Personen

Die vitalen Funktionen

**Bewusstsein / Atmung / Kreislauf**


sind bedroht, gestört oder ausgefallen

- Erstbeurteilung nach Leitsymptomen
- Arbeiten und Therapie nach Algorithmen
- Einleiten erweiterte lebensrettende Sofortmassnahmen
- Gezielte Schmerztherapie
- Korrektes Bergen
- Vermeiden von Folgeschäden
- Psychologische Erstbetreuung von Patienten, Angehörigen und mitbetroffenen Passanten

# Arbeitsinstrument Algorithmus

- Definierte Leitlinien
- Dient als Instrument für die Einsatznachbesprechung
- Qualitätssicherung

Algorithmus 12: Allergische Reaktion



## Zum Beispiel bei der Verabreichung von Medikamenten

### Anexate®

Ampullen:	5ml = 0,5mg
Indikation:	(Unklare) Bewusstlosigkeit bei V.a. <del>Benzodiazepinwirkung</del>
Dosierung Erw.:	Initial 0,3mg i.v., dann 0,1mg-weise bis 1mg
Dosierung K.:	- (wenig untersucht)
Wirkungen:	<del>Benzodiazepinantagonist</del>
Nebenwirk.:	Selten Übelkeit u. Erbrechen
KI/Besonderes:	Nicht bei Epileptikern die mit Benzodiazepinen eingestellt sind (Krampfschwelle herabgesetzt). Ebenfalls ist Vorsicht geboten, wenn Pat. zyklische Antidepressiva einnimmt.
Kompetenz:	Bis 1x1 Amp. à 0.5 mg

RD ISEL Stand: 13.09.04

### Brevibloc®

Ampullen:	10ml = 100mg
Indikation:	- <del>BD-stabile tachykarde</del> Rhythmusstörungen - <del>Tachykarde</del> Vorhofflimmern/Vorhofflattern - Sinustachykardie - Supraventrikuläre Tachykardie - Hypertonie
Dosierung Erw.:	- 0.25 – 0.5mg/kg Initialdosis (5-10mg weise) - 0.025-0.05mg/kg/Min. Erhaltungsdosis über 4 Min.
Dosierung K.:	0.2mg/kg (selten indiziert bei Kindern)
Wirkungen:	Selektiver $\beta$ 1-Blocker mit: HF-Senkung, <del>BD-Senkung</del> , Senkung der Kontraktilität, Verminderung des myokardialen Sauerstoffverbrauches
Nebenwirk.:	Hypotonie, Bradykardie, Asthma
KI/Besonderes:	Kardiogener Schock, höhergradige Blockbilder (2./3.AV-Block, <del>Sick-Sinus</del> ), vorbestehende <del>Bradykardien/Hypotonien</del>
Kompetenz:	Keine

RD ISEL Stand: 13.09.04



Drei Rettungswagen Typ Mercedes Sprinter



Einsatzambulanz Typ Mercedes

Alle Einsatzfahrzeuge sind gleich ausgestattet

## **Grundausbildung (Tertiärstufe)**

3 Jahre

## **Verkürzte Ausbildung**

2 Jahre

## **Schule**

SIRMED – Schweizer Institut für  
Rettungsmedizin

## **Weiterbildung**

40 Stunden / Jahr

1. Wir sichern die präklinische Notfallversorgung im Einsatzgebiet Seetal
2. Die Hilfsfristen liegen in > 90% der Einsätze unter 15 Minuten
3. Wir leisten eine hochstehende Qualität bei der Erstversorgung unserer Patienten
4. Wir bleiben eine eigenständige, kostengünstige Organisation mit Standort in Hochdorf
5. Wir streben strategische Allianzen mit Organisationen aus dem Gesundheitswesen an
6. Der Rettungsdienst Seetal ist ein attraktiver Arbeitgeber
7. Wir verbessern fortlaufend unsere Strukturen und Prozesse

# Herzlichen Dank